


# Amsler-Gitter zur Früherkennung von Augenerkrankungen wie AMD (Altersbedingte Makula-Degeneration)

Der Amsler-Gitter-Test ist die einfachste Methode zur AMD-Früherkennung und kann auch zu Hause durchgeführt werden. Bei Verdacht auf eine Erkrankung kann er jedoch die Untersuchung beim Augenarzt nicht ersetzen!



**WICHMANN**  
ZENTRUM FÜRS HÖREN & SEHEN

**Wichmann Hörgeräte und Brillen**  
Celler Straße 58 // 31224 Peine // Tel. 05171-7906686  
[www.brillenwichmann.de](http://www.brillenwichmann.de)

## Anleitung

1. Schauen Sie in gewohnter Entfernung auf den Monitor, ggf. mit Ihrer gewohnten (Lese-) Brille.
2. Verschließen Sie ein Auge.
3. Fixieren Sie den Punkt in der Mitte des Gitters und achten Sie darauf, ob:
  - alle Linien des Gitters gerade sind
  - die Quadrate gleich groß und alle 4 Ecken sichtbar sind
  - Sie leere, verzerrte oder verschwommene Stellen sehen.
4. Wiederholen Sie den Test mit dem anderen Auge.

**Bei Unregelmäßigkeiten sollten Sie sich unverzüglich bei uns melden.**

Mit dem Amsler-Gitter sind Metamorphopsien nur schwer zu quantifizieren. Diese können ein Hinweis auf eine Netzhauterkrankung sein, bedeuten aber nicht zwangsläufig das Vorliegen einer altersbedingten Makuladegeneration.

